


آبسه آنورکتال

شرح بیماری

آبسه آنورکتال عبارت است از بروز آبسه (تجمع چرک ناشی از عفونت) در ناحیه اطراف مقعد و راست روده. این بیماری در مردان و در کسانی که مبتلا به بعضی بیماریهای گوارشی هستند بیشتر دیده میشود. این آبسه ممکن است درست در ناحیه سوراخ مقعدی یا به طور عمیقتر در جدار راست روده تشکیل شود.



علائم شایع

تورم (در آبسه های سطحی)
درد به هنگام لمس راست روده
درد ضرباندار

تب و دیگر علائم جدیدتر در مورد آبسه های عمیقتر
درد به هنگام اجابت مزاج

علل

باکتریهای شایع مثل استافیلوکوک و اشرشیاکولی شایعترین علل هستند. گاهی عفونتهای قارچی باعث بروز این آبسه میشوند.

عوامل تشدید کننده بیماری

افراد مبتلا به بیماری گوارشی
تزریق برای درمان بواسیر داخلی
آسیب ناشی از نوک وسیله تنقیه
زخم ناسب از دفع پوسته تخم مرغ یا استخوان ماهی
جسم خارجی
بواسیر بیرون زده

پیشگیری

جلوی بروز یبوست را بگیرید.
از تنقیه خودداری کنید.

عواقب مورد انتظار

بهبود آبسه به آهستگی صورت میگیرد و زمان آن بسته به وسعت آبسه متفاوت است. اگر عارضهای اتفاق نیفتاد، آبسه در عرض ۶ ماه کاملاً بهبود مییابد.

عوارض احتمالی

احتمال ایجاد فیستول مقعدی
عود آبسه در صورت عدم درمان علت زمینه ساز

درمان

تشخیص با معاینه بالینی داده میشود.

درمان شامل بازکردن آبسه و تخلیه آن است.

حین جراحی از بیحسی موضعی استفاده میشود. برای آبسههای عمیقتر در راست روده، معمولاً از بیهوشی عمومی استفاده میشود.

نشستن در لگن آب گرم هر ۲-۴ ساعت، پس از عمل جراحی، هر بار برای ۲۰ دقیقه در لگن یا وان حمام که ارتفاع آب گرم در آن ۱۵-۲۰ سانتیمتر است بنشینید.

استفاده از صفحه گرمکننده، لامپ گرمکننده یا کمپرس گرم برای تخفیف درد

جلوی بروز یبوست را بگیرید. در صورت احساس اجابت مزاج، از آن خودداری نکنید، حتی اگر درد داشته باشید. یبوست میتواند باعث افزایش فشارروی زخم محل جراحی شود.

دستورات پزشک را در رابطه با تعویض پانسمان و تمیز نگاه داشتن محل جراحی رعایت کنید.

داروها

برای عفونت ممکن است آنتیبیوتیک یا داروی ضدقارچ تجویز شود

مسهلهای نرمکننده مدفوع برای جلوگیری از یبوست

فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری

پس از جراحی، در زودترین زمان ممکن فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری های عادی خود را از سر بگیرید.



آبسه آنورکتال

ABSCESSANORECTAL

تهیه و تنظیم:

دایره آموزش بیمارستان بانک ملی ایران

کتابخانه

آدرس: تهران، خیابان فردوسی، محوطه ادارات
مرکزی بانک ملی ایران، بیمارستان بانک ملی

تلفن: ۰۲۱-۶۱۴۲۳۷۱۰

www.bmihospital.ir

رژیم غذایی

افزایش میزان فیبر در رژیم غذایی میتواند به کاهش خطر بروز یبوست کمک کند.

در چه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟

اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان علائم آبسه آنورکتال را دارید.

اگر دچار علائم جدید و غیرقابل کنترل شده اید . توجه داشته باشید که داروهای مورد استفاده در درمان ممکن

است عوارض جانبی به همراه داشته باشند.