


انعقاد داخل عروق منتشر

شرح بیماری

انعقاد داخل عروق منتشر عبارت است از یک اختلال جدی در مکانسیمهای انعقاد خون، که منجر به خونریزی خارجی یا داخلی میشود. این اختلال، عارضهای از بعضی مشکلات زمینساز دیگر به شمار میرود.



علائم شایع

خونریزی در یک یا چند نقطه بدن. خونریزی ممکن است شدید باشد. علائم شایع خونریزی عبارتند از: - استفراغ خونی یا مدفوع سیاه و قرمز - خونریزی از مجرای تناسلی زنان (جدا از خونریزی عادت ماهانه) - قرمز یا تیره شدن ادرار - بروز خون مردگی بدون دلیل

درد شدید شکم یا کمر در نتیجه خونریزی داخلی در اعضای بدن

تشنج (به ندرت)

اغما (به ندرت)

علل

خالی شدن خون از مواد مؤثر در انعقاد و تثبیت لخته، که موجب بروز خونریزیهای گسترده میشود. بروز این حالت علل مختلفی دارد:

اختلالات حاملگی، مثل جفت سر راهی، کنده شدن زودرس جفت، یا مسمومیت حاملگی (اکلامپسی)

عفونت گسترده یا عمده

سرطان گسترده

بعضی از انواع جراحی

تخریب گسترده بافتی، مثلاً در سوختگیهای وسیع

گزیده شدن توسط مار سمی

تزریق خون جور نشده با خون گیرنده

عوامل تشدید کننده بیماری

تغذیه نامناسب

کاهش مقاومت بدن در اثر بیماری

پیشگیری

جهت درمان علت زمینه ساز فوراً به پزشک مراجعه کنید.

عواقب مورد انتظار

اگر علت زمینساز انعقاد داخل عروقی منتشر به سرعت درمان شود، احتمال میرود که فرد بهبود یابد.

عوارض احتمالی

نارسایی کلیه

شوک

قانعاریا و از دست دادن اندام

خونریزی در حفره ریه

درمان

اغلب بیمارانی که گرفتار این اختلال شدهاند به طور ناامیدانهی بدحال هستند و نیازمند مراقبت ویژه در بیمارستان هستند. کمکی که اعضای خانواده میتوانند، بکنند این است که نگرشی مثبت و امیدوارانه داشته باشند.

به هنگام بهبودی، کروت روی زخمها را بر ندارید. این کار ممکن است باعث خونریزی مجدد شود.

گاهی برای رفع علت زمینه ساز، جراحی انجام میشود.

داروها

تزریق خون یا فرآوردههای خونی

تزریق هپارین (یک داروی ضدانعقاد)

آنتیبیوتیک برای عفونت



انعقاد داخل عروق منتشر

COAGULATION IN TRARVASCULAR DISSEMINATED

تهیه و تنظیم:

دایره آموزش بیمارستان بانک ملی ایران

بایب ۱۳۹۳

فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری

استراحت در رختخواب

رژیم غذایی

رژیم خاصی توصیه نمیشود. هر نوع غذایی که بیمار بتواند برحسب وضعیتش تحمل کند.

در چه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟

اگر شما یا یکی از اعضای خانواده‌تان انعقاد داخل عروق منتشر را دارید. این یک مورد اورژانس است.

اگر علائم پس از درمان بازگردند.

آدرس: تهران، خیابان فردوسی، محوطه ادارات مرکزی بانک ملی ایران، بیمارستان بانک ملی

تلفن: ۰۲۱-۶۱۴۲۳۷۱۰

www.bmihospital.ir